

MAYO 2022

PAXLOVID®

Es un nuevo medicamento de administración oral indicado en personas ≥ 18 años para el tratamiento de la COVID-19 leve o moderada, que no requieran aporte de oxígeno suplementario, y con riesgo de progresar a grave.

Paxlovid® está indicado en pacientes:

1. No vacunados* > 80 años
2. No vacunados* > 65 años y con al menos un factor de riesgo:
 - a. Enf hepática crónica moderada clase B Child-Pugh
 - b. Enfermedad neurológica
 - c. Enfermedad cardiovascular
 - d. Enfermedad pulmonar crónica
 - e. Diabetes con afectación de órgano diana
 - f. Obesidad (IMC ≥ 35)
3. Inmunodeprimidos

Cada comprimido contiene:

Nirmatrelvir 150 mg (Comprimido rosa)

↳ Inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2

Ritonavir 100 mg (comprimido blanco)

↳ Potenciador farmacocinético del nirmatrelvir

Importante: el tratamiento debe iniciarse en los primeros 5 días tras el diagnóstico de COVID-19.

Un inicio posterior puede reducir su eficacia.

300 mg nirmatrelvir (2 comp rosa)

+

POSOLOGÍA 100 mg ritonavir (1 comp blanco)

Cada 12 horas, durante 5 días.


El tratamiento debe finalizarse incluso si el paciente empeora y requiere hospitalización.

Si se olvida una dosis y han pasado menos de 8 h, debe tomarla cuanto antes y continuar el tratamiento a las horas programadas. Si han pasado más de 8 h, debe omitir la dosis olvidada y continuar el tratamiento a las horas habituales. Nunca se debe duplicar una dosis para compensar una dosis olvidada.

INTERACCIONES principales

- Analgésicos: petidina, piroxicam
- Antiarrítmicos: amiodarona, dronedarona, flecainida
- Antibióticos: ácido fusídico, rifampicina
- Anticonvulsivos: carbamazepina, fenobarbital
- Antipsicóticos: pimozida, clozapina, quetiapina
- Derivados del ergot: dihidroergotamina, ergotamina
- Fármacos para disfunción eréctil: avanafil, sildenafil, vardenafil
- Fármacos para la gota: colchicina
- Plantas medicinales: hipérico
- Sedantes/somníferos: clorazepato, diazepam, flurazepam, midazolam
- Tratamiento hiperplasia benigna próstata: alfuzosina
- Tratamiento de la angina de pecho: ranolazina
- Tratamiento del colesterol: lovastatina, simvastatina

SOLICITUD
A través de AxonFarma (Comprobar que en RXXI está prescrita y visada)



DISPENSACIÓN
Dispensar en RXXI y
Dispensar en AxonFarma



Sin aportación
No se recorta cupón precinto

REACCIONES ADVERSAS

Suele ser bien tolerado, aunque pueden darse vómitos, diarrea, dolor de cabeza y alteraciones del gusto.

* Persona que no ha recibido la pauta de vacunación completa (incluidas las dosis de recuerdo) y que no haya padecido la enfermedad en los 3 últimos meses.