

OCTUBRE 2022

GRUPE: ¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR?

CAMPAÑA 2022/23

Existe una fuerte **recomendación para la vacunación antigripal** en toda la población diana.

- ✓ Las importantes medidas de seguridad durante estos dos años, han provocado un menor contacto con los virus respiratorios, por lo que existe **gran incertidumbre sobre la intensidad e impacto** que pudiera tener la gripe este año
- ✓ En el hemisferio sur, la epidemia de gripe se ha adelantado, sobre la fecha habitual y con una **incidencia mayor**
- ✓ La **coinfeción de gripe y COVID - 19** presenta **mayor riesgo** de muerte que ambas por separado

NOVEDAD - CAMPAÑA 2022/23. Vacunación niños de 6 a 59 meses (ambos inclusive) (importante carga de enfermedad y papel muy relevante en la transmisión del virus al resto de la comunidad)

PERSONAS RESIDENCIAS Y CENTROS SOCIO SANITARIOS
Centros residencias de mayores
Personas internas en centro de discapacidad

Desde 3 octubre

EMBARAZADAS
En cualquier trimestre del embarazo, mujeres durante el puerperio y hasta 6 meses tras el parto no vacunadas

Desde 17 octubre

PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO
Residencias de mayores y similares, de centros discapacidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios y estudiantes en prácticas

Desde 3 octubre

Desde 17 octubre

Desde 24 octubre

POBLACIÓN DIANA

OTROS GRUPOS PROFESIONALES
Fuerzas y Cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, granjas de aves o cerdos

A partir de diciembre

PERSONAS >80 AÑOS
PERSONAS ≥ 65 AÑOS - 79 AÑOS
PERSONAS CON ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES
Adultos < 65 años, adolescentes o niños > 5 años

Desde 17 octubre

CONVIVIENTES EN EL HOGAR CON PERSONAS > 65 AÑOS O DE RIESGO

PATOLOGÍAS CRÓNICAS

- Enfermedad crónica
- Diabetes mellitus
- Obesidad mórbida (IMC ≥ 40 adultos, IMC ≥ 35 adolescentes o ≥ 3 desviaciones estándar en la infancia)
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
- Hemoglobinopatías y anemias
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples
- Asplenia o disfunción esplénica grave
- Enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo crónico)
- Enfermedades neuromusculares graves
- Inmunodeficiencias primarias (incluyendo déficit de complemento)
- Inmunodeficiencias adquiridas (incluyendo la originada por VIH, por fármacos y trasplantados)
- Cáncer y hemopatías malignas
- Implante coclear o en espera del mismo
- Fístula del líquido cefalorraquídeo
- Enfermedad celíaca
- Enfermedad inflamatoria crónica:
- Trastornos y enfermedades con disfunción cognitiva: Síndrome de Down, demencia y otras
- Personas 6 meses-18 años en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico
- Menores 6-24 meses nacidos prematuros con menos 32 semanas de gestación

Cardiovascular (incluye paciente con HTA)
Neurológica
Respiratoria (incluye displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma)

Artritis reumatoide
Lupus eritematoso sistémico
Enfermedad inflamatoria intestinal